

Ficha técnica:

Chontal 200

Registro N°:13-H26/NA.



TITULAR: AGROFIELD CIA. LTDA

DISTRIBUIDO POR ADAMA ANDINA B.V. SUCURSAL ECUADOR

Tipo de producto:	Herbicida Agrícola
Formulación	Concentrado soluble SL
Ingrediente activo	Glufosinate ammonium
Concentración	200 gramos por litro
Categoría Toxicológica	3 Moderadamente peligroso
Cultivo	Banano
Target	Gramíneas, hoja ancha y Ciperaceas
Presentación	1 l, 4 l y 20 l
Grupo químico	Phosphinic acid, HRAC H, WSSA 10

Modo de acción: Herbicida de contacto no selectivo con un poco de acción sistémica. La translocación se produce sólo dentro de las hojas, predominantemente de la base de la hoja a la punta de la hoja.

Mecanismo de acción: Inhibidor de la glutamina sintetasa; conduce a la acumulación de iones de amonio, y la inhibición de la fotosíntesis.

Generalidades:

Chontal 200 es un herbicida no selectivo, de contacto con algún tipo de acción sistémica. Inhibela enzima Glutamina sintetasa (GS), provocando que en los dos días siguientes a la aplicación se evidencia en la aparición de manchas de color amarillo o verde pálido en las hojas

Sistema de preparación y aplicación:

Se aplica sobre el follaje de las malezas cuando éstas tengan de 3-5 hojas funcionales. Se recomienda antes de realizar la mezcla el uso de fijador y regulador de pH de 4 a 5, posteriormente vierta en el tanque de preparación la dosis a utilizar de **Chontal 200**, en la mitad de volumen de agua, agite bien y complete el volumen de agua requerido. Mantenga en

ADAMA

ADAMA Andina B.V. Sucursal Ecuador, Puerto Santa Ana, Manzana 1, Solar 8-1, Edificio "The Point", piso 5to, oficina 506
Guayaquil – Ecuador PBX: + (593) 2597919 – 3883800 | www.adama.com

agitación constante. No guardar la mezcla, aplique el mismo día de su preparación. Asegurar una cobertura total del follaje de las malezas a controlar.

Recomendaciones de uso

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS
Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA)	Pata de gallina (<i>Eleusine indica</i>) Paja mona (<i>Leptochloa filiformis</i>) Cortadera (<i>Cyperus ferax</i>) Coquito (<i>Kyllinga odorata</i>) Campanilla (<i>Merremia umbellata</i>)	1.5 l/ha

Gasto de agua 300 l/ha

Periodo de reingreso:

Se debe espera por lo menos 4 horas antes de ingresar al área tratada.

Periodo de carencia:

No Aplica

Fitotoxicidad:

Usado a las dosis y con los métodos de aplicación recomendados no presenta fitotóxicidad en el cultivo.

Compatibilidad

No se conoce incompatibilidad con los plaguicidas de uso común en el cultivo. No se recomienda mezclar con productos alcalinos como el Caldo Bordelés, Sulfato de lima o cal.

“El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Elaborado por:
Departamento Técnico ADAMA
Fecha de actualización:
18-09- 2025 (PARB)