

THIOPRON® 825 SC

FUNGICIDA

INFORMACIÓN GENERAL	
INGREDIENTE ACTIVO	Azufre
NOMBRE QUÍMICO	-
GRUPO QUÍMICO	Calcógenos
CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN	82,5 % p/v (825 g/L) SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)
MODO DE ACCIÓN	Fungicida de contacto para uso preventivo en el control de Oídio en vides, como se indica en el Cuadro de Instrucciones de Uso.
FABRICANTE/FORMULADOR	Cerexagri S.A.S. – Grupo UPL, Francia
DISTRIBUIDOR EN CHILE	Arysta LifeScience Chile S.A. una empresa UPL
TOXICIDAD	Grupo IV. Producto que normalmente no ofrece peligro. Banda toxicológica verde.
ANTÍDOTO	No existe antídoto específico. Tratamiento base.
AUTORIZACIÓN SAG N°	2.000-0023

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
THIOPRON® 825 SC es un fungicida de contacto para uso preventivo en el control de Oídio en vides, como se indica en el Cuadro de Instrucciones de Uso.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO PARA APLICACIÓN TERRESTRE:			
CULTIVO	ENFERMEDAD	CONCENTRACIÓN (cc/100 L de agua)	OBSERVACIONES
Vid (mesa, pisquera y vinífera)	Oídio de la vid (<i>Erysiphe necator</i>)	300 - 600	Aplicar preventivamente con brotes desde 10 a 15 cm en adelante, y cuando se presenten condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad, con intervalos de 7 días entre cada aplicación. Realizar máximo 6 aplicaciones por temporada.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA
Agregar la cantidad de THIOPRON® 825 SC al estanque parcialmente lleno de agua bajo agitación constante. Completar el resto de agua, manteniendo la agitación.

COMPATIBILIDAD
THIOPRON® 825 SC presenta compatibilidad física con formulaciones de tipo gránulos dispersables, polvos humectables, fluidos líquidos y emulsiones concentradas comúnmente utilizadas. Sin embargo, antes de realizar una mezcla, se recomienda hacer una prueba de compatibilidad y/o consultar a nuestro departamento técnico.

INCOMPATIBILIDAD
THIOPRON® 825 SC no es compatible con aceites minerales. Evitar mezclas antes y/o poco después de aplicaciones realizadas con aceites y/o surfactantes.

FITOTOXICIDAD
THIOPRON® 825 SC no es fitotóxico si se utiliza en las dosis recomendadas en esta etiqueta. No aplicar inmediatamente después de una aplicación de aceite. Se debe esperar al menos dos semanas. No usar después de pinta.

PERÍODO DE CARENCIA

No presenta restricciones de carencia. Para cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país de destino.

TIEMPO DE REINGRESO

No reingresar al área tratada antes de 24 horas después de la aplicación. Para animales no corresponde indicar tiempo de reingreso al área tratada, por tratarse de cultivos cuya producción no está destinada a la alimentación animal.

OTROS

THIOPRON® 825 SC es un fungicida multi-sitio a base de azufre, por lo que posee bajo potencial de presentar o generar resistencia. Pertenece al grupo químico de los calcógenos, código FRAC M 02. **THIOPRON® 825 SC** puede ser usado en mezcla con otros productos de diferente modo de acción.