

GLYFOCOR®



Concentrado Soluble (SL)

NOMBRE COMÚN: Glyphosate isopropylamine salt.

FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN: Concentrado Soluble (SL) que contiene 480 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.

TOXICIDAD: Categoría Toxicológica III-Ligeramente Peligroso.

MODO DE ACCIÓN: Herbicida sistémico.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: GLYFOCOR® es un herbicida sistémico no selectivo, absorbido por el follaje y con rápida translocación a través de la planta. Inactivado en contacto con el suelo.

MODO DE EMPLEO: Agregar agua limpia y fresca hasta la mitad del volumen del recipiente a ser utilizado, mezclar la dosis recomendada de GLYFOCOR®, agitar y mezclar bien la solución. Agregar poco a poco agua, hasta completar el volumen requerido y agitar para homogenizar la mezcla. La aplicación se debe realizar sobre el follaje de las malezas.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Se recomienda aplicar GLYFOCOR® en post emergencia a las malezas y en aplica-

ción dirigida al follaje de las malezas cuando se encuentran en crecimiento activo y tienen entre 1 a 2 hojas verdaderas o 15 cm de altura. El producto se aplica una sola ocasión.

PERÍODO DE REINGRESO: No reingresar al área tratada hasta 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: GLYFOCOR® es compatible con muchos otros pesticidas. Se recomienda siempre comprobar a través de un estudio, su compatibilidad con otros pesticidas.

IMPORTANTE: Después de usar el contenido, enjuagar 3 veces el envase y verter el agua del lavado en el tanque de aplicación. Perfore el envase y deposítelo en un lugar seguro. Usar los insumos agrícolas, con el debido conocimiento, y teniendo en cuenta las instrucciones dadas en la etiqueta.

PRESENTACIONES:

Frasco x 500 ml
Frasco x 1 litro
Envase x 1 galón
Envase x 10 litros
Envase x 20 litros
Envase x 5 galones
Tanque x 200 litros

REGISTRO NACIONAL N°: 39-H 33/NA

FABRICADO Y FORMULADO POR: CAMFALL CORPORATION.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: AFECOR, FEBRES CORDERO CÍA. DE COMERCIO S.A.

INSTRUCCIONES DE USO DE GLYFOCOR®

CULTIVOS	PLAGA	DOSIS (l/ha)	PERÍODO DE CARENCIA
BANANO (<i>Musa acuminata</i> AAA)	Pata de gallina (<i>Eleusine indica</i>)	2.5	14 días
	Paja de patillo (<i>Echinochloa colona</i>)		
	Cortadera (<i>Cyperus odoratus</i>)		
	Ortiga brava (<i>Laportea aestuans</i>)		
BORDES DE ÁREAS AGRÍCOLAS	Caminadora (<i>Rottboellia cochinchinensis</i>)	1.5	No aplica
	Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>)		
	Lechosa (<i>Euphorbia heterophylla</i>)		