

TOP COP



Stoller

FICHA TÉCNICA

Formulación:	LÍQUIDO	
Composición Química:	AZUFRE (S)	50,0%
	COBRE (Cu)	4,4%
pH	6 – 7	
Compatibilidad orgánica:		

GENERALIDADES:

TOP COP Es un fungicida líquido en forma de pasta fluida con formulación única a base de azufre y cobre , desarrollado para controlar un gran espectro de enfermedades fungosas.

VENTAJAS:

TOP COP pertenece a la familia de las «pastas fluidas», de gran impacto en la agricultura de los últimos años..

TOP COP es un fungicida líquido de tamaño promedio de partícula de 0,75 micras con lo que se cubre una mayor área superficial, proporcionando una excelente cobertura y retención del producto, cuando es aplicado sobre la superficie de la hoja.

TOP COP contiene azufre en su formulación creando un medio ácido sobre la hoja que solubiliza el cobre manteniendo con ello un efectivo control de la enfermedad.

TOP COP es un producto que se encuentra registrado como fungicida para una serie de cultivos ante la Agencia Protectora del Medio Ambiente (EPA) de los Estados Unidos.

DOSIS RECOMENDADAS Y FORMAS DE APLICACIÓN:

CULTIVO	DOSIS L/200L	FRECUENCIA DE APLICACIÓN
Arroz y otros cereales	0.5-1.0	Aplicar al inicio de la formación de panículas. Aplicar cada 14 días.
Hortalizas: brócoli, cebolla, espárrago, fresa, melón, pimiento, tomate, zanahoria, zapallo.	0.5-1.0	Iniciar las aplicaciones en crecimiento activo del cultivo. Repetir cada 10 a 14 días.
Papa	0.5-1.0	Aplicar durante el crecimiento activo del cultivo cada 14 días.
Cítricos: mandarina, naranja, nectarina, etc.	1.0-2.0	Aplicar en la etapa de crecimiento vegetativo; repetir cada 4 semanas.
Frutos Tropicales: Cacao, café, papaya, piña, mango, bananas y otros.	0.5 -1.0	Aplicar en etapa de crecimiento vegetativo cada 14 días. Luego mensualmente después del cuajado del fruto. En época seca se puede aplicar cada 21 días.
Frutales caducifolios: manzano, durazno, pera.	0.5-1.0	Iniciar en estado de punta rosada y a la caída de pétalos.
Banano	0.75/ha	Control de sigatoka como fungicida protectante, dentro del programa de control de la enfermedad.
Piña	4 lt/ha.	Control de Phytophthora parasitica y P. sinnamoni (pudrición del cogollo) Iniciar aplicaciones en crecimiento vegetativo cada 14 días

RECOMENDACIONES ESPECIALES Y CULTIVOS RECOMENDADOS:

Agitar el envase antes de usar el producto. Añadir la dosis recomendada en el tanque parcialmente lleno. Mantener la agitación durante el llenado y la aspersión. Puede aplicar con equipo terrestre o aéreo. Usar mínimo 20 litros de solución por hectárea.

No mezclar **TOP COP** con productos que contengan Calcio por el riesgo de precipitación.

El azufre en contacto con el oxígeno produce el ión sulfato, como resultado genera un medio ácido que ayuda a solubilizar el sulfato de cobre, necesario para la liberación gradual del cobre dentro de la célula vegetal.

Tratamiento de semilla: Para proteger las semillas contra enfermedades del suelo; aplicar TOP COP directamente a la semilla antes de la siembra empleando 5-7cc/kg de semilla.

No mezclar **TOP COP** con aceite mineral ni realice la prueba de aplicación dentro de los ocho días después de una aplicación de aceite agrícola

TOP COP Está recomendado para todos los cultivos siguiendo las instrucciones de la etiqueta.

PRESENTACION DE VENTA:

500 CC

1 LT 20 LT 208 LT

Importado y distribuido por: **AGRONPAXI CIA. LTDA.**
Fabricado por: **STOLLER INTERNATIONAL INC.**

PARA MAS INFORMACIÓN CONSULTE CON EL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE AGRONPAXI CIA.LTDA. info@agronpaxi.com / www.agronpaxi.com

PRECAUCIONES

Agítese antes de usar. Debe guardarse en su empaque original en lugar seguro, fresco y seco. No cambie de su envase original. Manténgase fuera del alcance de los niños, los animales y personas irresponsables. No mezcle con productos que no sean aprobados por el fabricante. Realice primero una prueba de compatibilidad en un recipiente empleando las proporciones que utilizará en la aplicación para establecer la compatibilidad física de los productos.

PELIGRO

Su ingestión es dañina. Evite su inhalación. Puede causar irritación en la nariz, garganta y/o piel. Evite el contacto con ojos, piel y ropa. En caso de que haya sido ingerido, provoque el vómito introduciendo el dedo en la garganta del paciente. Nunca le dé nada en forma oral a una persona inconsciente. En caso de que los ojos hubieran estado en contacto, lavarlos con abundante agua por lo menos 15 minutos. Obtenga ayuda médica.

GARANTÍA

El fabricante garantiza que este producto contiene los ingredientes especificados y razonablemente sirve para los propósitos aquí indicados cuando se usa de acuerdo a las instrucciones bajo circunstancias normales. Nadie, excepto el representante legal del fabricante, está autorizado para hacer alguna garantía o instrucción sobre el producto.

Debido a que el almacenamiento, la época, lugar y dosis de aplicación están fuera del control del vendedor, eventuales daños a causa del mal uso o almacenamiento, no son responsabilidad del vendedor.