

POWMYL®



We create chemistry

Fungicida*Suspensión concentrada (SC)*

COMPOSICIÓN O FORMULACIÓN: Suspensión Concentrada (SC), contiene 250 g/l de Diethofencarb.

DESCRIPCIÓN O ACCIÓN FITOSANITARIA: Fungicida para el control de Sigatoka negra.

MODO DE ACCIÓN: Diethofencarb es un fungicida sistémico con acción preventiva y curativa, que pertenece al grupo de los N-fenil carbamatos.

MECANISMO DE ACCIÓN: Diethofencarb actúa a nivel del ensamblaje de la Beta tubulina en la mitosis celular. FRAC: B2: 10.

TOXICIDAD: Categoría Toxicológica - III Ligeramente peligroso.

MODO DE EMPLEO: Puede ser aplicado vía aérea asegurando una completa cobertura del área foliar, para aplicaciones aéreas seguir las recomendaciones sobre calibración de equipos de aplicación aérea (avión). Para aplicación en banano, siempre aplicar en emulsión agua/aceite utilizando 5 – 7 litros de aceite + emulsificante. Sobre la preparación de la mezcla, seguir los siguientes pasos: 40% del Agua + 100% del aceite + 100% del emulsificante + Agitación por 3 minutos + 100 % dosis de POWMYL® + Agitación 3 minutos + 60% (resto) del agua + Agitación 3 minutos.

PRECAUCIONES Y/O RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN: Durante el manejo, aplicación y lavado del equipo de aplicación, utilice equipo de protección completo: Sombrero, gafas protectoras, mascarilla, overol, guantes y botas de hule. Lave el equipo de aplicación y de protección después de cada jornada. No lave la ropa de protección junto con la ropa de uso normal. Evite el contacto directo con el producto. No tiene antídoto específico. Tratar al paciente sintomáticamente. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los plaguicidas y fertilizantes foliares usados comercialmente. Hay que revisar la compatibilidad física de cada mezcla previamente y verificarla. Además, hay que evitar mezclas de reacción alcalina como caldo bordelés y soluciones sulfocálcicas.

ALMACENAMIENTO: No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga los plaguicidas en contacto con otros insumos como fertilizantes, semillas, etc. Almacene y transporte este producto bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor. Conserve el producto en su envase original, etiquetado, con su panfleto y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

PRESENTACIONES:

Frasco x 5 l.

Envase x 60 l.

Envase x 200 l.

REGISTRO: 221-F2/NA.

ELABORADO POR: SUMITOMO CHEMICAL ECUADOR S.A.

DOSIS Y APLICACIÓN POWMYL®:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
BANANO (<i>Musa acuminata</i> AAA)	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	0.6 l/ha